

Traduction inofficielle de la notice allemande

MODE D'EMPLOI – À lire attentivement!

Gel pour brûlures et plaies Medice®



Composition:

eau purifiée, glycérol 85%, urée, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, monohydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, alginat de sodium, lauréth-9, chlorure de benzéthonium, sorbate de potassium

Forme pharmaceutique et contenu

1 boîte contient 25/50 g de gel.

Mécanisme d'action

Gel pour brûlures et plaies, couvrant et rafraîchissant, n'empêche pas l'échange d'humidité naturel entre la peau et la plaie.

Fabricant

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,
Téléphone: +49 2371/937-0, fax: +49 2371/937-329, E-Mail: info@medice.de, www.medice.de

Indication thérapeutique

Indiqué pour le traitement des brûlures du 1^{er} et du 2^e degré (formation de cloques), des coups de soleil, des lacérations et des piqûres d'insectes. À appliquer en couche mince sur la peau lésée. Le gel pour brûlures et plaies Medice® sèche lentement. Il se forme un film perméable à l'air qui protège les zones de peau atteintes, sans pour autant influencer l'écoulement des sécrétions hors de la plaie. Après l'application le gel laisse un agréable effet rafraîchissant sur la peau.

C'est pourquoi le gel est indiqué pour le traitement des brûlures du 1er et du 2e degré (formation de cloques), des coups de soleil, des lacérations et des piqûres d'insectes.

Contre-indications

Quand ne faut-il pas appliquer le gel pour brûlures et plaies Medice®?

En cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Avertissements et précautions

Quelles sont les précautions d'emploi à observer?

Ne pas appliquer dans l'œil.

Lors d'une brûlure plus étendue et/ou qui paraît plus profonde, il faut en tous les cas consulter un médecin avant le traitement par le gel pour brûlures et plaies Medice®.

Il faut également consulter un médecin si une brûlure ou une plaie traitée par le gel pour brûlures et plaies Medice® devient rouge, gonfle ou que la cicatrisation de la plaie ne démarre pas après quelques jours.

Interactions

Quels sont les autres dispositifs médicaux ou médicaments qui influencent l'effet du gel pour brûlures et plaies Medice® ou dont l'effet est influencé par le gel pour brûlures et plaies Medice® ?

Veillez noter que ces informations peuvent également s'appliquer à des médicaments ou à d'autres dispositifs médicaux ayant été récemment utilisés.

La libération d'autres substances actives à partir d'autres préparations cutanées et leur absorption cutanée peuvent être renforcées par le gel pour brûlures et plaies Medice®. C'est pourquoi le gel pour brûlures et plaies Medice® ne devrait pas être appliqué au même endroit en même temps que d'autres préparations cutanées.

Posologie, mode et durée d'administration

Veillez suivre les consignes d'utilisation, car sinon le gel pour brûlures et plaies Medice® ne peut pas agir correctement .

Après avoir prélevé du gel, le tube doit être bien refermé. À cet effet, n'utilisez que le bouchon d'origine. Lors de l'utilisation du gel pour brûlures et plaies Medice®, évitez toute cassure et pliure du tube en l'enroulant du bas vers le haut.

Quelle quantité de gel pour brûlures et plaies Medice® devez-vous appliquer et à quelle fréquence?

Appliquez le gel pour brûlures et plaies Medice® en couche mince avec des doigts propres et secs, un pansement ou un coton propre. L'ouverture du tube ne doit pas entrer en contact avec la plaie.

Dès que l'effet rafraîchissant et protecteur diminue, l'application peut être répétée plusieurs fois par jour de la même manière.

Comment et quand appliquer le gel pour brûlures et plaies Medice®?

Le gel pour brûlures et plaies Medice® ne doit pas être appliqué sur une surface étendue pendant une période prolongée. Il est préférable de laisser sécher ce gel lentement pour que les zones de peau atteintes soient protégées plus longtemps. Sur des parties du corps non couvertes, il faut si possible renoncer à l'application d'un pansement; mais en cas de besoin, on peut recouvrir le film de gel sec d'un pansement. Sous le gel qui a séché en devenant lisse, la plaie évolue dans des conditions de propreté qui se mettent en place rapidement et qui ont tendance à favoriser la cicatrisation. Le film de gel est perméable à l'air et à l'humidité.

On garde ainsi une bonne vue d'ensemble sur la plaie, ce qui laisse toute latitude aux soignants suivants pour prendre les mesures qui pourraient éventuellement s'avérer nécessaires par la suite. Dans le cas de plaies fortement suintantes, il faut commencer par les nettoyer avec des compresses stériles avant de les traiter avec le gel pour brûlures et plaies Medice®.

Pendant combien de temps le gel pour brûlures et plaies Medice® doit-il être appliqué?

La durée de l'application dépend du déroulement du processus de guérison

Erreurs d'utilisation et surdosage

Que faire si le gel pour brûlures et plaies Medice® a été appliqué en trop grande quantité (surdosage intentionnel ou accidentel)?

Il faut dans ce cas laver et éliminer le gel avec de l'eau tiède.

Effets secondaires

Quels effets indésirables le gel pour brûlures et plaies Medice® peut-il provoquer?

Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez vous adresser à votre pharmacien ou au fabricant. Ceci s'applique également aux effets indésirables non mentionnés dans cette notice.

Le gel pour brûlures et plaies Medice® est généralement bien toléré. Dans de rares cas, le composant laureth-9 peut entraîner une réaction cutanée, probablement sur une base allergique. En cas de prédisposition allergique, le développement d'une réaction d'hypersensibilité apparaît en l'espace d'environ 1 à 2 semaines. L'urée, un composant du gel, peut rapidement provoquer des irritations au niveau de zones de peau inflammatoires ou suintantes.

Quelles sont les mesures à prendre en cas d'effets indésirables?

Arrêter d'utiliser le gel. Consulter votre médecin.

Remarques et données relatives à la stabilité du dispositif médical

La date de péremption est imprimée sur le tube et sur l'emballage. Le gel pour brûlures et plaies Medice® ne doit plus être utilisé après la date de péremption!

Le gel pour brûlures et plaies Medice® ne se conserve que pendant 12 mois après la première ouverture.

Dans quels cas le gel pour brûlures et plaies Medice® ne doit-il pas non plus être utilisé avant la date de péremption?

Quand le tube est endommagé, car cela peut entraîner la décomposition des ingrédients. C'est pourquoi vous ne devez pas utiliser de tube endommagé.

Comment conserver le gel pour brûlures et plaies Medice®?

Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.

Mise à jour de l'information:

janvier 2016

Signification des symboles figurant sur l'emballage



Respecter le mode d'emploi



Ne pas utiliser de tube endommagé



Limite de température supérieure



EXP:



Numéro de lot



Ce dispositif médical doit être conservé hors de la portée des enfants!