

Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша

Инструкция по применению – внимательно ознакомьтесь с ней!

Гель для лечения ожогов и ран Медице®



Состав:

Вода очищенная, глицерол 85 %, мочеви́на, натрия дигидрофосфат дигидрат, натрия моногидрофосфат додекагидрат, натрия альгинат, лаурет-9, бензетония хлорид, калия сорбат

Форма выпуска и содержание

1 упаковка содержит 25/50 г геля

Принцип действия

Образующий защитную пленку и охлаждающий гель для лечения ожогов и ран, не препятствует естественному влагообмену кожи и раны.

Производитель

МЕДИЦЕ Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Куловег 37, 58638 Изерлон,
Телефон: +49 2371/937-0, Факс: +49 2371/937-329, e-мейл: info@medice.de, www.medice.de

Показания для применения

Для лечения ожогов 1-ой и 2-ой степени (образование пузырей), солнечных ожогов, ссадин и укусов насекомых. Для нанесения тонким слоем на пораженный участок кожи. Гель для лечения ожогов и ран Медице® медленно высыхает и образует воздухопроницаемую пленку, которая защищает пораженные участки кожи, не препятствуя оттоку раневого секрета. При нанесении гель оказывает приятное охлаждающее воздействие

В связи с этим показано применение при ожогах 1-ой и 2-ой степени (образование пузырей), солнечных ожогах, ссадинах и укусах насекомых.

Противопоказания

В каких случаях нельзя применять гель для лечения ожогов и ран Медице®?

При повышенной чувствительности к одному из компонентов.

Меры предосторожности при применении и предостережения

Какие меры предосторожности следует соблюдать?

Не допускать попадания в глаза.

В случае обширного и/или глубокого ожога следует в любом случае обратиться к врачу, перед тем как начинать лечение гелем для лечения ожогов и ран Медице®. Если во время использования геля для лечения ожогов и ран Медице® ожог или рана покраснеет, опухнет, или через несколько дней не наступит улучшение, следует также обратиться к врачу.

Взаимодействие

Какие другие медицинские продукты или лекарственные препараты оказывают влияние на действие геля для лечения ожогов и ран Медице[®], или может быть оказано влияние на их действие?

Обратите внимание на то, что данная информация может также касаться тех лекарственных препаратов или других медицинских продуктов, которые применялись Вами недавно.

Гель для лечения ожогов и ран Медице[®] может усилить высвобождение действующих веществ из других кожных препаратов и их проникновение в кожу. В связи с этим не следует применять гель для лечения ожогов и ран Медице[®] совместно с другими кожными препаратами на одном и том же участке кожи.

Рекомендации по дозировке, способ и длительность применения

Пожалуйста, придерживайтесь инструкции по применению, поскольку в противоположном случае гель для лечения ожогов и ран Медице[®] не сможет оказать необходимое воздействие. Необходимо плотно закрывать тюбик с гелем после каждого применения. Используйте для этого только оригинальную крышечку.

При использовании геля для лечения ожогов и ран Медице[®] избегайте трещин и изломов тюбика, скручивая тюбик с плоского конца наверх.

В каком количестве и как часто следует применять гель для лечения ожогов и ран Медице[®]?

Гель для лечения ожогов и ран Медице[®] следует наносить тонким слоем чистыми и сухими пальцами, при помощи пластыря или чистого ватного шарика. Отверстие тюбика не должно соприкасаться с раной.

Как только охлаждающее и защитное действие геля закончится, можно повторить применение указанным выше способом.

Как и когда следует применять гель для лечения ожогов и ран Медице[®]?

Не следует применять гель для лечения ожогов и ран Медице[®] в течение длительного времени на больших участках кожи. Медленное высыхание геля является желательным для данного препарата, чтобы обеспечить более длительную защиту пораженных участков кожи. На открытых частях тела следует, по возможности, избегать перевязывания ран; однако, при необходимости, можно наложить повязку на высохший слой геля. Под гладким слоем присохшего геля рана остается чистой, и ее состояние способствует хорошему ее заживлению. Гелевая пленка является воздухо- и влагопроницаемой. Рана остается хорошо видимой, тем самым предоставляя полную свободу выбора для возможно необходимого последующего лечения.

Раневые поверхности с сильным выделением секрета следует сначала очистить стерильными салфетками и лишь затем нанести гель для лечения ожогов и ран Медице[®].

Как долго следует применять гель для лечения ожогов и ран Медице[®]?

Длительность применения зависит от протекания процесса заживления.

Ошибки в применении и передозировка

Что следует делать, если гель для лечения ожогов и ран Медице[®] был нанесен в слишком больших количествах (намеренная или случайная передозировка)?

Гель можно смыть теплой водой.

Побочные эффекты

Какие побочные эффекты могут возникнуть при применении геля для лечения ожогов и ран Медице®?

Если Вы заметите какие-либо побочные эффекты, обратитесь к своему фармацевту или производителю геля. Это также касается побочных эффектов, которые не упомянуты в данной инструкции по применению.

Гель для лечения ожогов и ран Медице®, как правило, хорошо переносится. В редких случаях входящий в состав геля лаурет-9 может вызвать кожную реакцию, предположительно аллергического характера. Если имеется соответствующая предрасположенность, повышенная чувствительность развивается в течение примерно 1-2 недель. Входящая в состав мочевины может вызвать кратковременное раздражение на воспаленных участках кожи или мокнущих ранах.

Какие меры следует предпринять при побочных эффектах?

Прекратите применять препарат. Обратитесь к своему врачу.

Рекомендации и данные по срокам хранения медицинского продукта

Дата окончания срока годности данной упаковки напечатана на тубике и на картонной коробке. Не применяйте гель для лечения ожогов и ран Медице® после истечения этого срока! После вскрытия тубика гель для лечения ожогов и ран Медице® можно использовать только в течение 12 месяцев.

Когда не следует применять гель для лечения ожогов и ран Медице® даже до истечения срока годности?

Если тубик поврежден, может происходить разложение компонентов геля. Поэтому не следует использовать гель из поврежденного тубика.

Как следует хранить гель для лечения ожогов и ран Медице®?

Хранить при температуре ниже 25 °С.

Состояние информации:

Январь 2016

Пояснение символов на упаковке



Соблюдать инструкцию по применению



Не использовать поврежденный тубик.



Верхняя граница температуры



Использовать до



Номер партии



Данный медицинский продукт следует хранить в месте, недоступном для детей!