

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi.

Kullanma talimatı - Lütfen dikkatle okuyunuz!

Medice® Yanık ve Yara Jeli



Bileşimi:

Saflaştırılmış su, %85 gliserin, üre, sodyum dihidrojenfosfat-dihidrat, sodyum monohidrojenfosfat-dodekahidrat, sodyum aljinat, Laureth-9, benzetonyum klorür, potasyum sorbat

Dozaj şekli ve içeriği

1 ambalaj 25/50 g jel içerir

Etki şekli

Örtücü ve serinletici yanık ve yara jeli; cildin ve yaranın doğal nem alışverişini engellemez.

Üretici firma

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn, Almanya
Telefon: +49 2371/937-0, Faks: +49 2371/937-329, e-posta: info@medice.de, www.medice.de

Kullanım amacı

1. ve 2. derece yanıkların (su toplaması), güneş yanıklarının, sıyrıkların ve böcek sokmalarının tedavisinde kullanılır. Cildin yaralı bölgesine ince bir tabaka halinde sürülür. Medice® yanık ve yara jeli yavaş kurur. Cildin zarar görmüş bölgelerini yara sıvısının akmasını engellemeden koruyan ve hava geçiren bir film oluşur. Jel uygulama sırasında hoş bir serinlik etkisi yaratır. Bu nedenle 1. ve 2. derece yanıklarda (su toplaması), güneş yanıklarında, sıyrıklarda ve böcek sokmalarında kullanılması önerilir.

Kontrendikasyonlar

Medice® yanık ve yara jelini hangi durumlarda kullanmamalısınız?

İçerdiği maddelerden birine karşı bilinen aşırı hassasiyet olması durumunda.

Uygulamayla ilgili uyarı ve önlemler

Hangi ihtiyati önlemler alınmalıdır?

Gözlerle temasından kaçınılmalıdır.

Daha büyükçe ve/veya derine işlediği izlenimi uyandıran yanıklarda Medice® yanık ve yara jeli ile tedaviden önce mutlaka bir hekime danışılmalıdır.

Medice® yanık ve yara jelinin uygulanması sırasında yanıkta veya yarada kızarıklık, şişlik baş göstermesi ya da bir kaç gün içerisinde iyileşme görülmemesi halinde yine bir hekime baş vurulmalıdır.

Etkileşimler

Medice® yanık ve yara jelinin etkisinde değişim meydana getiren ya da kendi etkisi onun tarafından etkilenen tıbbi ürünler veya ilaçlar hangileridir?

Lütfen bu bilgilerin kısa bir süre önce uygulamış olduğunuz ilaçlar ya da başka tıbbi ürünler için de geçerli olabileceğini unutmayınız.

Medice® yanık ve yara jeli diğer cilt ilaçlarının içerdiği etken maddelerin salınımını ve cilde nüfuzunu artırabilir. Bu nedenle, Medice® yanık ve yara jeli diğer cilt ilaçları ile birlikte aynı bölgede uygulanmamalıdır.

Dozaj talimatları, uygulamanın şekli ve süresi

Medice® yanık ve yara jelinin etkisini tam olarak gösterebilmesi için lütfen kullanma talimatına uyunuz. Jeli kullandıktan sonra tüpün kapağını tekrar sıkıca kapatınız. Bunun için lütfen orijinal kapağı kullanınız.

Medice® yanık ve yara jeli kullanırken tüpü dip kısmından yukarıya doğru kıvrırsanız, tüpün kırılmasını ve bükülmesini önlersiniz.

Medice® yanık ve yara jelini ne miktarda ve ne sıklıkta uygulamalısınız?

Medice® yanık ve yara jelini ellerinizi yıkayıp kuruladıktan sonra parmaklarınızla ya da bir gazlı bez veya temiz bir pamuk ped yardımıyla ince bir tabaka halinde uygulayınız. Tüpün ağzı yaraya temas etmemelidir.

Jelin serinletici ve koruyucu etkisi hafiflediğinde uygulamayı aynı şekilde tekrarlayabilirsiniz.

Medice® yanık ve yara jelini nasıl ve ne zaman uygulamalısınız?

Medice® yanık ve yara jelini geniş yüzeylere uzun süreli uygulamayınız. Jelin yavaş kuruması, cildin etkilenmiş olan bölgelerinin daha uzun süreyle korunması için bu ilaç bakımından istenen bir etkidir. Vücudun açıkta kalan yerlerinde mümkünse sargı bezi kullanmaktan kaçınılmalıdır; ancak ihtiyaç halinde kurumuş haldeki jelin üzerine sargı uygulanabilir. Düzgün bir şekilde kuruyan jelin altında hızlı bir iyileşme için olumlu, temiz yara koşulları oluşur. Jel film havayı ve nemi geçirir. Yaranın şeffaflığı etkilenmez, dolayısıyla tedaviyi sürdüren sağlık uzmanı olası gerekli önlemleri almak için tam bir hareket serbestliğine sahip olur. Yoğun sıvı salgılayan yara yüzeyleri önce steril bir pedle temizlenmeli ve Medice® yanık ve yara jeli bundan sonra uygulanmalıdır.

Medice® yanık ve yara jelini ne kadar süreyle uygulamalısınız?

Uygulamanın süresi iyileşme sürecindeki gelişmeye bağlıdır.

Uygulama hataları ve doz aşımı

Medice® yanık ve yara jeli fazla miktarda uygulandığında (bilerek ya da yanlışlıkla doz aşımı) ne yapılmalıdır?

Jel ılık suyla yıkanabilir.

Yan etkiler

Medice® yanık ve yara jelinin uygulanması sırasında ne gibi yan etkiler görülebilir?

Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen eczacınıza veya üretici firmaya danışınız. Bu husus, bu kullanma talimatında belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir.

Medice® yanık ve yara jeli genelde iyi tolere edilir. İçerdiği Laureth-9 maddesine bağlı olarak ciltte nadiren alerji kökenli olduğu düşünülen reaksiyonlar görülebilir. Herhangi bir yatkınlık olması durumunda yaklaşık 1-2 hafta içerisinde aşırı hassasiyet gelişir. Jelin içerdiği üre maddesi cildin iltihaplı bölgelerinde veya ıslak yaralarda kısa süreli tahrişlere yol açabilir.

Yan etkiler görülmesi durumunda ne gibi önlemler alınmalıdır?

İlacı uygulamaya son verin. Doktorunuza başvurun.

Tıbbi ürünün raf ömrüne dair notlar ve bilgiler

Bu ambalajın son kullanma tarihi tüpün ve katlanır kutunun üzerine basılmıştır. Medice® yanık ve yara jelini bu tarihten sonra kullanmayınız!

Medice® yanık ve yara jeli tüp açıldıktan sonra yalnızca 12 ay kullanılabilir.

Medice® yanık ve yara jeli hangi koşullarda son kullanma tarihi geçmemiş olmasına rağmen kullanılamaz?

Tüp hasarlanmışsa, ilacın bileşenlerinin bozunması söz konusu olabilir. Bu nedenle lütfen hasar görmüş tüpleri kullanmayınız.

Medice® yanık ve yara jeli nasıl saklanmalıdır?

25°C'nin üzerinde saklamayınız.

Bilgi güncelliği:

Ocak 2016

Ambalaj üzerindeki sembollerin açıklaması



Kullanma talimatını dikkate alın



Hasarlı tüpleri kullanmayın.



Üst sıcaklık sınırı



Son kullanma tarihi



Parti tanımı



Bu tıbbi ürün çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği bir yerde saklanmalıdır!